



PANCREATECTOMIA DISTAL CON CONSERVACIÓN DEL BAZO POR LESION SÓLIDA EN LA COLA DEL PANCREAS.



LADA, PE(1); CABALLERO, F; MASSA, M; JURADO, D; MARIOT, D; JANIKOW, C(1)

(1)Servicio de Guardia Central del Hospital Nacional de Clínicas. Univerisad Nacional de Córdoba.

Antecedentes: Las lesiones sólidas de la cola del páncreas por general representan un adenocarcinoma, tumores neuroendocrinos no funcionantes.

Objetivos: El tejido esplénico ectópico es una entidad común, con una prevalencia del 10 % en la población general. La localización intra-pancreática es más rara.

Material Y Método: Pte varón de 54 años, con dolor en hipocondrio izquierdo de un mes de evolución con irradiación a región lumbar y flanco izquierdo. Pérdida de peso de 5 Kg. Examen físico S/P. Ecografía de abdomen presenta imagen sólida de 3 cm. en cola del páncreas. T.A.C de Abdomen confirma imagen (fig 1). Sospecha de malignidad. R.M.N muestra lesión sólida de 3 cm. en cola del páncreas (fig 2). C.P. RMN normal. A.C.E. Elevado y CA 19-9 normal.

